

NIEUWE BIJDRAGE
TOT DE KENNIS DER
INLANDSCHE SPINNEN

DOOR

G. A. S I X.



Mijne naamlijst van spinnen in de provincie Utrecht gevonden, werd in 1858 in de *Bouwstoffen voor eene Fauna van Nederland* uitgegeven. Sedert dien tijd ben ik steeds ijverig bezig geweest met het verzamelen en determineren van deze gewoonlijk verwaarloosde diertjes en het is mij gelukt niet alleen bijna alle aldaar, opgegevene soorten terug te vinden, maar verscheidene welke mij toen zeldzaam voorkwamen, heb ik sedert dikwijls aangetroffen. Daarenboven vond ik 22 voor onze Fauna nieuwe soorten, waarvan ik de namen hier opgeef en waarbij ik 6 andere gevoegd heb, welke ik in de collectie van mijn' vriend van Hasselt zag. Het aantal der mij bekende inlandsche spinsoorten bedraagt nu 135.

ARANEAE.

EPEIRIDES.

Epeira, Walck.

- 7^a. *quadrata*, Clerck. Koch. V. fig. 381—82. Walck. Een ♀ Drieb. Oct.
II. p. 57.
- 7^b. *dromedaria*, Walck. II. p. 126. Koch. XI. Verscheidene ♀ en 1 ♂,
Walck. fig. 906—7. *Ulrichi* Hahn, Drieb. bosch., Oct.
fig. 159.
- 7^c. *sclopetaria*, Koch. XI. fig. 934—35. *agalena* Eenige ♀ Drieb. bosch.,
Clerck. Hahn. II. fig. 115. *solers* Oct.
Walck. II. p. 41.

Singa, Koch.

11. *conica*, Walck. Zie mijne lijst. Dikwijls te Drieb. in Oct.

Episinus, Walck.

15. *truncatus*, Walck. Zie mijne lijst. Dikwijls in het Drieb.
bosch in Oct.

THERIDIDES.

Meta, Koch.

- 17^a. *cellulana*, Clerck. Koch. VIII. fig. 691—2. *L. tho-* In kelders, Utr. van
racica Wid. tab. 17. fig. 11. Hasselt.

Ero, Koch.

19. *tuberculata*, Deg. Zie mijne lijst. ♂ en ♀ niet zelden in
het Drieb. bosch in Oct.

Theridium, Walck.

- 29^a. *simile*, Koch. Koch. III. fig. 215 ♀, VIII. fig. ♂ en ♀ op Erica te Drieb.
649 ♂. Walck. II. p. 314. April en Junij.
- 29^b. *guttatum*, Wider. Wider tab. 16. fig. 7. Koch. ♂ Drieb., Junij. Mijn ex.
VIII. fig. 651. Walck. II. heeft aan wederzijde
p. 318. van het achterlijf 3
gele vlekjes.

Linyphia, Walck.

31. *multiguttata*, Zie mijne lijst. Daar ik het ♀ nu ook
Wider. gevonden heb, vervalt
hetgeen ik in de noot
omtrent deze soort
zeide.
36. *bimaculata*, L. Zie mijne lijst. *Th. Carolinum*, 2 ♀ Drieb. Oct. 2 ♂,
Walck. II. p. 315. Junij Rijzenb.

44. *phaeopus*, Koch. Zie mijne lijst.

In April onder mos. Bij de oogen staan eenige regtop staande haartjes. Mijn ex. komt wegens de lichtbruine pooten goed overeen met *alutaceus* Koch. XII. f. 1073, welke ik even als Koch geloof dat eene var. van *phaeopus* is.

Micryphantes, Koch.

46^b. *flavomaculatus*, Koch. III. fig. 220.
Koch.

Een ♀, Drieb. Mei.

46^c. *sanguinolentus*, Walck. II. p. 326.

Twee ♀, Drb. Sept. Walck. haalt bij deze soort (II. p. 507) *Phrurol. rufescens* Koch. VI. fig. 514 aan, maar deze soort heeft de dijen en een langstreep op het achterlijf geel, waarvan Walck. niet spreekt en die mijne ex. ook niet hebben.

46^d. *sulcifrons*, Wider. Wider tab. 15. f. 10. Walck. II. p. 362.

Een ♂, Drieb. Sept.

46^e. *quaternus*, Walck. Walck. II. p. 359.

Verscheidene ♀ te Drieb. in Sept. en bij Utr. in Mei.

56^f. *cheliferus*, Wider. Wider. tab. 16. fig. 4. Walck. II. p. 364.

Een ♂. Drieb. Oct. De palpen zijn zeer zonderling gevormd.

Dictyna, Sund.

49. *variabilis*, Koch. Zie mijne lijst.

Niet zelden bij de Bildt, Sept. en Drieb. Oct. op eikenbladen.

Phrurolithus, Koch.

55^a. *festivus*, Koch. Koch. VI. fig. 511—12.

♂ en ♀ veel langs een zandig dijkje op mieren-nesten, bij Utr. in Apr.

55^b. *corollatus*, L. Koch. VI. fig. 504—5. *Th. albomaculatum* Hahn. I. fig. (58) 59. Walck. II. p. 293.

Twee ex. in de coll. van Hass.

46^d. Koch. VIII. p. 97 haalt *sulcifrons* Wid. bij zijn' *M. ovatus* als synon. aan, doch zeker ten ooregte, daar deze laatste geene tuberculae op den kop heeft.

AGELENIDES.

Hahnia, Koch.

- 58^a. *pusilla*, Koch. Koch. VIII. fig. 637—8. ♂ Drieb. Oct."

Philoica, Koch.

- 59^a. *atrica*, Koch. Koch. X. fig. 825. Utr. in huizen, v. Hass.

Anyphaena, Sund.

60. *accentuata*, Walck. Zie mijne lijst. Niet zelden bij Drieb. in Aug. en Oct.

DRASSIDES.

Phytonissa, Koch.

- 63^a. *nocturna*, L. Walck. I. p. 615. *nana*, Koch. Niet zelden in het Drieb. X. fig. 833. bosch, onder planten.
63^b. *subterranea*, Koch. Koch. VI. fig. 491. 92. *Drass.* Een ♀ in het Drieb. bosch. *nigritus* Hahn. I. fig. 93.

Macaria, Koch.

64. *formosa*, Koch. Zie mijne lijst. Veel langs een zandig dijkje bij Utr. April, Drieb. bosch, Junij.
64^a. *fulgens*, Walck. Walck. I. p. 622. pl. 16. f. 5. Een ♂ op heigronnd langs *aurulenta*, Koch. VI. fig. 499; het dennenbosch, bij *fastuosa*, Koch. VI. fig. 498. Drieb. Julij.
is het ♀ dezer soort volgens Walck. II. p. 487.

Drassus, Walck.

- 65^a. *lapidicola*, Latr. Koch. VI. fig. 450—51. Hahn. Een ♂ coll. van Hass. II. fig. 100. *lapidicolens*, Walck. II. p. 598.

Clubiona, Latr.

- 67^a. *compta*, Koch. Koch. VI. t. 440. X. f. 841. Een ♂ van Hasselt, bij Amersfoort.

Melanophora, Koch.

- 67^b. *pallens*, Koch. Koch. VI. f. 443—44. Niet zelden in het Drieb. bosch, in Oct.

LYCOSIDES.

Ocyale, Sav.

- 69^a. *rufofasciata*, de Geer. Koch. XIV. fig. 1347. volgens Een ♀ in het Drieb. bosch. Walck. var. van *mirabilis*.

THOMISIDES.

Thomisus, Koch.

- 85^a. *dorsatus*, F. Hahn. I. fig. 34. Koch. XII. Twee ♂ coll. van Hass.
fig. 991—92. *floricolens*
Walck. I. 532.

Xysticus, Koch.

- 86^a. *sabulosus*, Hahn. Hahn. I. fig. 24. Koch. XII. Twee ♀ Drieb. Sept.
fig. 999—1000.
90. *praticola*, Koch. Zie mijne lijst. Nogmaals in mijnen tuin
bij Utr., Maart. Een ♂
Drieb., Junij.
90^a. *horticola*, Koch. Koch. IV. fig. 296—98. Een ♂ bij de Bildt onder
bladen in April; de
pullus bij Drieb. Oct.

Thanatus, Koch.

- 92^a. *oblongus*, Müll. Hahn. I. f. 82. Walck. I. 558. Amersf. heide, Six. Sche-
veningen, v. Hass.

Philodromus, Latr.

93. *aureolus*, Clerck. Zie mijne lijst. ♂ en ♀, Rijzenb. Junij.
94. *limbatus*, Sund. Zie mijne lijst. Nogmaals het ♂ in mij-
nen tuin te Utr., Mei.

Sparassus, Walck.

- 95^a. *ornatus*, Walck. Walck. I. p. 583. Koch. XII. Zeist, Sept.
fig. 1021.

ATTIDES.

Heliophanus, Koch.

- 97^a. *flavipes*, Hahn. Hahn. I. fig. 50. Koch. XIV. Het ♀ op heigronnd bij de
fig. 1321—22. Ik geloof dat Bildt, April en Aug.
H. dubius Koch. var. is van
flavipes en dat *nitens* Koch.
fig. 1319, een ♀ is van
flavipes met geheel gele poo-
ten, zoo als Hahn. I. fig. 50
er een afgebeeld heeft en ook
ik te Drieb. gevonden heb.